

Voorbeeld van een Postpartum Psychose Preventie Behandelplan

Naam:

Gravida: Para:

À terme datum:

Psychiatrische diagnose:

Psychiatrische voorgeschiedenis:

Vermeld ook of patiënte klachten had tijdens eerdere zwangerschap of na eerdere partus.

Somatische diagnose:

Obstetrische voorgeschiedenis:

Vermeld bijzonderheden eerdere bevallingen.

Huidige zwangerschap:

Medische complicaties en of patiënte stabiel is tijdens deze zwangerschap.

Medicatie tijdens de zwangerschap:

Huidige medicatie inclusief start datum, spiegels en mogelijke gevolgen ongeboren kind.

Bevalling:

Vermeld als er een inleiding gepland is, sectio of pijnstilling en waar de bevalling gaat plaatsvinden. Vermeld ook de naam van de gynaecoloog.

Borstvoeding:

- Mevrouw geeft wel/geen borstvoeding. Lactatieremmers zijn gecontra-indiceerd.
- Verpleegkundige/ partner neemt de nachtvoeding over.

Medicatie na de bevalling:**Indien medicatie gebruikt werd tijdens de zwangerschap:**

De baby zal direct na de bevalling door de kinderarts worden onderzocht i.v.m. psychofarmacagebruik en gedurendeuur geobserveerd worden op ontweningsverschijnselen. (Bij Lithium: In navelstrengbloed zal de lithiumspiegel, TSH, fT4, en TSI bepaald worden).

Signaleringsplan:**Nazorg:**

Hoe lang medicatie te continueren?

.....

Psychiater

Mw.....

.....

(naam patiënte, en handtekening)

Kopie:

- Huisarts
- Behandelend gynaecoloog
- Patiënte zelf
- Behandelaren in de GGZ